



**Intsen  
búcsút aknés,  
pigmentált  
bőrének!**

# LÉZERES HÁMLASZTÁS

BŐRMEGÚJÍTÁSRA IDŐRŐL IDŐRE MINDENKINEK SZÜKSÉGE VAN, FŐKÉNT EGY BIZONYOS KOR FELETT. AZ ŐSZI-TÉLI IDŐSZAK PEDIG KIFEJEZETTEN KEDVEZ A LÉZERES ELJÁRÁSOKNAK, AMELYEK CSODÁKRA KÉPESEK.

**A** fiatalabbak szenvedhetnek a pattanásoktól, azok helyétől, azaz az aknés arcbőrtől, míg a 30-as, 40-es vagy idősebb korosztály a ráncoktól, a fokozott pigmentációtól, a fakó arcbőrtől, a napozás utáni sérülésektől. Mindezen problémák korrigálására nyújt kiváló alternatívát, megoldást a frakcionált széndioxid lézeres kezelés.

- Az eredmény tartós és rendkívül látványos, annak köszönhetően, hogy a lézeres kezelés hatására beindul a regenerálódási folyamat, így a bőrben lévő kollagént és rugalmas rostokat tartalmazó sejtek újra aktiválódnak, és fokozott termelésbe kezdenek - magyarázta a Fehérhajó Revital Orvos Esztétikai Center bőrgyógyász-kozmetológus-lézerspecialistája. - A páciens bőrének megfelelően a lézernyalábok mélységét, sűrűségét és energianagyságát is tudjuk változtatni. A lézernyalábok elégetik a bőr felsőbb rétegeit, mélyebben pedig elpárologtatják a hámsejteket, hegeket, ereket, faggyúmirigyeket. A bőr a természetes védekezési funkciója miatt úgy érzékeli, mintha seb,

sérülés keletkezne rajta. Az eljárás nemcsak a pigmentfoltokat halványítja és a hegek mélységét csökkenti, hanem szabályozza a faggyúmirigy termelődését, mindezek mellett pedig fiatalítja az arc, a nyak és a dekoltázs bőrét. Kisebbségi probléma, apróbb ráncok esetén elég egy kezelés, komolyabb bőrhibáknál az első alkalmat követően 1 hónap múlva ismételni kell. Az eljárás fájdalommentes, az eredmény viszont hamar meglátszik, és hosszan tart, kb. 4-10 hét a kollagéneképződés elindulása, ami hónapok múlva, sőt esetleg egy-két évig is fennáll. A kezelés után 2 hétig kerülni kell a vérbőségre vezető testmozgásokat, valamint 4 hétig nem ajánlott az agresszív arckezelés. Az eljárást követő néhány napban kifejezett bőrpírra, égő érzésre, majd a 3. naptól apró elemű hámlásra számíthatunk. A kezelés előtt és után legalább 4 héttel kerülni kell a napozást, a szolárium használatát; így lehet minimalizálni a pigmentálódás veszélyét. A fertőzésveszély elkerülése érdekében két-három hétig uszoda, szauna használata nem javasolt. ●